

## U gaat vaginaal bevallen

Wel of geen synthetische oxytocine na de bevalling om bloedverlies te verminderen?

Oxytocine is een hormoon dat je lichaam maakt en voor (na)weeën zorgt. Synthetisch oxytocine is in de fabriek gemaakt, en werkt hetzelfde.

De beschikbare landelijke richtlijnen adviseren synthetische oxytocine na de geboorte om **veel** bloedverlies te voorkomen. Deze consultkaart kan helpen bij het maken van de beslissing voor de keuze wel of geen oxytocine na de bevalling toe te dienen.

Mogelijkheden →	Wel oxytocine na de bevalling	Geen oxytocine na de bevalling
<b>Hoe wordt oxytocine gegeven?</b>	Oxytocine wordt gegeven met een prik in je bovenbeen. Dit kan even pijn doen. Heb je al een infuus? Dan wordt de oxytocine gegeven via het infuus. Hier voel je niets van.	Niet van toepassing
<b>Wanneer?</b>	Het wordt direct na de bevalling gegeven.	Niet van toepassing
<b>Wat zijn de risico's voor je baby</b>	Er is een onderzoek bekend (Buckley, 2015), waarin staat dat het onduidelijk is of het gebruik van synthetische oxytocine van invloed is op de hechting tussen moeder en kind of het opgang komen van de borstvoeding.	Niet van toepassing
<b>Wat zijn de risico's voor de moeder?</b>	De meest voorkomende bijwerkingen van synthetische oxytocine kunnen zijn: hoofdpijn, snelle hartslag, trage hartslag, onregelmatige hartslag, misselijkheid. Je kunt (zoals bij elk medicijn) een allergische reactie krijgen. Er is geen wetenschappelijk verband tussen depressies in het kraambed en het toedienen van oxytocine.	Vaker meer dan 1 liter bloedverlies (zie voor meer informatie kopje "wat zijn de voordelen"). Bij een thuisbevalling kan het zijn dat je met <b>veel</b> bloedverlies na de bevalling per ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht.
<b>Wat zijn de voordelen?</b>	In NL krijgt van alle mensen die bevallen 5 a 6 % meer dan 1 liter bloedverlies na de bevalling. Het toedienen van synthetische oxytocine zorgt voor 50% minder bloedarmoede direct na de bevalling.	Niet van toepassing
<b>Je hebt een keuze</b>	Niet van toepassing	Wanneer je ervoor kiest om geen synthetische oxytocine te krijgen, kunnen we hier afspraken over maken over wanneer je dit alsnog zou willen (bijvoorbeeld wanneer er veel bloedverlies optreedt na de bevalling of bij bepaalde risicofactoren)